

Data badania

Godzina badania

(godzina badania może ulec przesunięciu
ponieważ czas badania jest trudny do przewidzenia)

I. PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII

- 1) 5 dni przed badaniem nie jeść owoców i warzyw zawierających drobne pestki (pomidory, winogrona, arbuzy, kiwi, siemię lniane, itp.)
- 2) 2 dni przed badaniem należy przejść na dietę pozbawioną resztek pokarmowych. Nie spożywać zupełnie: warzyw i owoców, potraw tłustych, kasz, soków przecierowych, zup warzywnych, ciemnego pieczywa z ziarnem, napojów gazowanych. Zalecana dieta półpłynna, ryż, makaron, chleb jasny bez pestek, mięso i ryby gotowane, duszone lub grilowane, jasne kisiele bez owoców, przecedzony bulion, napoje niegazowane i herbata.
- 3) 1 dzień przed badaniem rano wziąć 2 tabletki **Bisacodylu**. Należy pić przezroczyste, jasne płyny w dużej ilości: woda, słaba herbata, klarowny sok, przecedzony bulion, i nic nie jeść do czasu badania.

II. ZASTOSOWANIE CITRAFLEET

Preparat Citrafleet to 2 saszetki leku. Każdą saszetkę rozpuszcza się w 150 ml wody. Zawartość saszetki należy dokładnie wymieszać z wodą (mieszać przez 2-3 min). Jeśli roztwór rozgrzeje się podczas mieszania, należy odczekać do momentu obniżenia temperatury. Lek wypić bezpośrednio po przygotowaniu. Po każdej dawce leku należy **odczekać 15-30 min**, a następnie wypić 2 l wody lub innych jasnych klarownych płynów.

UWAGA: wypicie 2 l płynów po każdej dawce jest KONIECZNE.

JAK DAWKOWAĆ PREPARAT CITRAFLEET

1 dawka Citrafleet	Wypicie płynu po 1 dawce Citrafleet	2 dawka Citrafleet	Wypicie płynu po 2 dawce Citrafleet	Godzina badania
18:00	Plus koniecznie wypić 2l wody lub innych klarownych, jasnych płynów	23:00	Plus koniecznie wypić 2l wody lub innych klarownych, jasnych płynów	08:00
21:00	Plus koniecznie wypić 2l wody lub innych klarownych, jasnych płynów	05:00	Plus koniecznie wypić 2l wody lub innych klarownych, jasnych płynów	09:00
22:00	Plus koniecznie wypić 2l wody lub innych klarownych, jasnych płynów	06:00	Plus koniecznie wypić 2l wody lub innych klarownych, jasnych płynów	10:00
23:00	Plus koniecznie wypić 2l wody lub innych klarownych, jasnych płynów	07:00	Plus koniecznie wypić 2l wody lub innych klarownych, jasnych płynów	11:00
23:00	Plus koniecznie wypić 2l wody lub innych klarownych, jasnych płynów	08:00	Plus koniecznie wypić 2l wody lub innych klarownych, jasnych płynów	12:00
23:00	Plus koniecznie wypić 2l wody lub innych klarownych, jasnych płynów	09:00	Plus koniecznie wypić 2l wody lub innych klarownych, jasnych płynów	13:00
05:00	Plus koniecznie wypić 2l wody lub innych klarownych, jasnych płynów	10:00	Plus koniecznie wypić 2l wody lub innych klarownych, jasnych płynów	14:00
06:00	Plus koniecznie wypić 2l wody lub innych klarownych, jasnych płynów	11:00	Plus koniecznie wypić 2l wody lub innych klarownych, jasnych płynów	15:00
07:00	Plus koniecznie wypić 2l wody lub innych klarownych, jasnych płynów	12:00	Plus koniecznie wypić 2l wody lub innych klarownych, jasnych płynów	16:00
08:00	Plus koniecznie wypić 2l wody lub innych klarownych, jasnych płynów	13:00	Plus koniecznie wypić 2l wody lub innych klarownych, jasnych płynów	17:00

Leki przyjmowane przez pacjenta a przygotowanie do badania.

Wszystkie zmiany w sposobie przyjmowania leków przed badaniem należy omówić z lekarzem kierującym. Na 7 dni przed badaniem nie przyjmować leków ani odżywek zawierających żelazo.