

Instrukcja przygotowania do kolonoskopii preparatem Clensia®



Program Badań Przesiewowych
**WCZESNE WYKRYWANIE
RAKA JELITA GRUBEGO**

Zastosowanie się do poniższych zaleceń ma istotne znaczenie dla bezpiecznego i skutecznego wykonania badania.



BARDZO WAŻNE!

Wypicie **całej ilości 2 litrów roztworu Clensia®**, zgodnie z poniższym schematem oraz dodatkowego minimum 1 litra klarownego płynu (bezalkoholowego) bez mleka gwarantuje dobre oczyszczenie jelita. Wypicie mniejszej ilości roztworu może spowodować niewystarczające oczyszczenie jelita. Lekarz nie będzie mógł wykonać kolonoskopii lub śluzówka jelita nie będzie dobrze widoczna i nie będzie można jej ocenić. Może to spowodować konieczność powtórnego przygotowania oraz powtórzenia badania.

Zalecenia lekarskie:

Od rozpoczęcia cyklu przygotowywania jelit do zakończenia zabiegu klinicznego nie należy spożywać pokarmów stałych.

Schemat z dawką podzieloną:

Pierwsza porcja preparatu	Druga porcja preparatu	Termin kolonoskopii
W dniu poprzedzającym badanie godz. 18.00	W dniu badania rano godz.....	Dzień..... godz.....
1. Rozpuścić 2 saszetki A i 2 saszetki B w 1 litrze wody i wypić tak przygotowany roztwór w ciągu około 1,5 godziny (1-2 godzin), w tempie około 250 ml co 15-20 minut.  2. Ponadto, w ciągu wieczoru należy wypić dodatkową porcję co najmniej 0,5 litra klarownego płynu (woda, sok owocowy, napój bezalkoholowy, herbata bez mleka). 	3. Rozpuścić 2 saszetki A i 2 saszetki B w 1 litrze wody i wypić tak przygotowany roztwór w ciągu około 1,5 godziny (1-2 godzin), w tempie około 250 ml co 15-20 minut.  4. Dodatkowo wypić 0,5 litra klarownego płynu (woda, sok owocowy, napój bezalkoholowy, herbata bez mleka). 	ZAKOŃCZYĆ PRZYJMOWANIE PŁYNÓW NA 2 GODZINY PRZED GODZINĄ WYZNACZONEGO BADANIA UWAGA! Pij dowolną ilość klarownych napojów (np. wodę, herbatę, kompot) do 2 godz. przed wyznaczoną godziną badania. Należy zachować co najmniej dwugodzinny odstęp pomiędzy zakończeniem przyjmowania płynu (Clensia lub klarowny płyn) a początkiem zabiegu klinicznego.

Jeśli kolonoskopia jest zaplanowana jako badanie w znieczuleniu / sedacji w godzinach przedpołudniowych to kroki **1. 2. 3. 4.** (instrukcja powyżej) wykonać po kolei w dniu poprzedzającym badanie. Pierwszą dawkę (kroki **1. 2.**) rozpocząć około godziny 16:00, a drugą dawkę (kroki **3. 4.**) około godziny 20:00. Proszę pamiętać, aby na 5 godzin przed badaniem w sedacji zakończyć spożywanie płynów.